


VIGILANCE Peste Porcine Africaine

Quand la SUSPECTER ?



SI VOUS CONSTATEZ sur vos PORCS	
<ul style="list-style-type: none"> • Appétit diminué, • Fièvre (plus de 40°C), • Augmentation de la consommation d'eau, • Abattement, • Regroupements inhabituels d'animaux, • +/- Rougeurs sur la peau (oreilles, abdomen...), • +/- Avortements et mortalité sous la mère 	<p style="text-align: center;">OU</p> <p style="text-align: center;">Augmentation de la mortalité</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">Doublement de la mortalité habituelle sur 15 jours dans 1 bande ou 1 salle</p>
<p style="text-align: center;">CONTACTEZ votre VETERINAIRE sans délai !</p> <p style="text-align: center;">« Mieux vaut signaler un cas suspect qui s'avèrerait négatif plutôt que de ne pas détecter la maladie »</p>	

La peste porcine africaine est une maladie contagieuse qui touche uniquement les porcs domestiques et les sangliers. Son introduction sur le territoire national et en élevage aurait des conséquences dramatiques pour la santé des animaux et l'ensemble de la filière porcine. La vigilance de tous est requise pour détecter très rapidement tout foyer qui pourrait survenir sur le territoire.

